

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA

Sulfato de neomicina + bacitracina zínica não tem eficácia clínica comprovada. Os poucos estudos que sugerem sua eficácia não são controlados. A neomicina induz sensibilidade de contato e reatividade cruzada com outros antibióticos. Sua absorção sistêmica (em áreas extensas de pele) pode causar ototoxicidade irreversível, particularmente em crianças, idosos e pacientes com insuficiência renal¹. Além do mais, na prática dos serviços tem se verificado o uso amplo e desnecessário de antibióticos tópicos. A limpeza do ferimento, em geral com água e sabão, consiste na primeira abordagem necessária.

Recomendação: exclusão de sulfato de neomicina + bacitracina zínica pomada (5 mg + 250 UI)/g da Remume 2011.

Referência

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Sulfato de neomicina + bacitracina zínica. In: *Relação nacional de medicamentos essenciais: Rename*. 5 ed. Brasília: Ministério da Saúde, p. 193-194, 2007.